

Le dégriffage est une procédure effectuée pour prévenir les blessures chez les humains et les autres chats et pour prévenir les dommages aux meubles. Généralement, seules les griffes avant sont retirées pour que l'animal puisse continuer à grimper et à se défendre. Cependant, il est recommandé de garder le chat à l'intérieur pour plus de sécurité.

Avant de prendre la décision de faire dégriffer votre chat, vous pouvez essayer de lui montrer à ne pas gratter. L'une des manières les plus faciles d'y arriver est de lui fournir un arbre à chat et de lui montrer comment l'utiliser. Certains vaporisateurs et d'autres produits comme « Feliway » et l'herbe à chat peuvent être utilisés pour attirer le félin sur l'arbre à chat. Vous pouvez aussi réduire les risques de grattage des meubles en utilisant un vaporisateur au citron.

## SOLUTIONS POUR ÉVITER LE DÉGRIFFAGE

1. Taille fréquente des griffes pour éviter les crochets qui sont la cause des dommages. Votre vétérinaire ou technicien peut vous montrer comment réaliser cette procédure simple à la maison.
2. Installation de protections sur les griffes appelées « soft paws ». Cela doit être répété au besoin puisque les griffes poussent. L'installation peut être faite à l'hôpital vétérinaire ou vous pouvez vous procurer une trousse pour le faire à la maison.
3. Prendre des précautions pour garder le chat loin des surfaces qui peuvent être facilement endommagées comme les meubles, les tissus, les papiers peints, etc.

L'opération de dégriffage ne devrait pas être réalisée dans le seul but de limiter les dangers associés à un chat agressif puisque celui-ci apprendra rapidement à utiliser ses dents.

Si vous décidez que le retrait des griffes avant est la meilleure solution à des problèmes existants ou potentiels, prenez rendez-vous avec votre vétérinaire. Votre chat sera à l'hôpital pendant 2 jours après l'opération. Cette chirurgie consiste en une anesthésie générale et une amputation de chaque orteil à la première phalange. Les incisions sont ensuite fermées avec de la colle cutanée et les pattes seront dans un bandage pour 24 à 48 heures.



## Des complications peuvent se produire après l'opération :

**Douleur.** Comme pour toute opération, les chats ressentent de la douleur après la procédure. Elle peut s'échelonner sur quelques jours à quelques semaines en fonction de l'âge, du niveau d'activité physique, de l'attitude et du poids du chat. Un timbre qui relâche de la médication est apposé sur le dos du chat pour 3 à 4 jours. De plus, de la médication orale doit être administrée pour au moins 3 jours. D'autres médicaments peuvent être données si nécessaire.

**Amorphie.** Plusieurs chats sont amorphes après l'opération, et ce, pour une période variable. Une amorphie persistante ne devrait pas se produire, mais si c'est le cas, le chat devrait être vu en consultation.

**Saignement.** Des saignements peuvent se produire si le chat a sauté d'une certaine hauteur. La force de l'atterrissage fait parfois ouvrir les incisions et cause des saignements. Si le saignement ne s'arrête pas tout seul et/ou que les incisions sont ouvertes, une nouvelle application de colle cutanée sera nécessaire.

**Infection.** Puisque l'emplacement de la chirurgie est près du sol, les bactéries peuvent facilement entrer dans les incisions. L'inflammation des orteils, des sécrétions, l'amorphie, le manque d'appétit et la léthargie sont tous des signes de problème et votre chat devrait être vu par un vétérinaire. Il est fort possible que des antibiotiques soient nécessaires pour enrayer le problème.

**Réouverture des incisions ou incapacité à guérir.** Les sites d'incisions peuvent être réouverts en raison d'un trauma ou d'un léchage excessif. Il est aussi possible que les incisions ne guérissent pas à cause d'une infection causée par le léchage excessif ou une réaction à la colle utilisée. Ces problèmes peuvent nécessiter une anesthésie et un nettoyage chirurgical des incisions afin qu'elles puissent guérir.

**Lésion du nerf radial.** Des lésions neurologiques, bien que ce soit rare, peuvent se produire lors du dégriffage. Les dommages peuvent conduire à une paralysie de l'avant-bras et une incapacité à marcher correctement. La paralysie peut durer aussi peu de 24 heures ou plusieurs semaines. Cependant, il y a toujours la possibilité que la paralysie soit permanente.

**Changements dans le comportement et la posture.** Des changements de comportement ont été rapportés chez certains chats de race, mais sont plutôt rares dans la majorité de la population de chats. De plus, le dégriffage change l'anatomie du pied et les chats peuvent subir de la douleur après la guérison ce qui peut les mener à arrêter l'usage de la litière et à développer d'autres problèmes de comportement. Des changements de posture peuvent aussi apparaître après l'opération en raison de la douleur et le déplacement du poids vers les pattes arrière ou de la perte des tendons fléchisseurs digitaux.

Même si tous les efforts sont faits pour éviter les complications avant, pendant et après l'opération, elles peuvent se produire, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des visites plus nombreuses à l'hôpital.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, appelez l'Hôpital vétérinaire Embrun pour parler à un vétérinaire ou un technicien.

