

Stériliser votre chat (mâle)



Hôpital vétérinaire
EMBRUN
Veterinary Hospital

QUE SIGNIFIE CASTRATION OU STÉRILISATION?

Stérilisation et castration sont les termes communs utilisés pour décrire la procédure chirurgicale connue sous le nom scientifique d'orchidectomie. Durant cette opération, les testicules sont retirés pour stériliser le chat mâle.

POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE STÉRILISER MON CHAT?

La stérilisation a des effets bénéfiques sur la santé du chat, surtout si elle a lieu à un jeune âge. Après la puberté, qui se produit généralement vers l'âge de 8 à 9 mois, le chat mâle développe souvent plusieurs comportements indésirables. Il deviendra territorial et commence à faire du marquage, même à l'intérieur de la maison, en urinant. Cette urine a une odeur persistante et elle est difficile à retirer. Lorsque le matou atteint sa majorité sexuelle, il commence à élargir son territoire, se promenant de plus en plus loin de la maison, particulièrement la nuit. C'est pour cette raison que plusieurs des chats qui sont frappés par des voitures sont des mâles non stérilisés. En agrandissant son territoire, le chat augmente ses chances d'entrer en contact avec d'autres chats et de se battre pour dominer le territoire. Les blessures de bagarre peuvent provoquer des infections et des abcès. Des maladies comme la FIV et le FeLV, qui peuvent causer le sida et des cancers chez les chats, sont transmises par les morsures de chats. Ces chats sont souvent affectés par ce type de maladies incurables. Finalement, la stérilisation prévient la naissance de nombreuses portées et la mort non nécessaire de dizaines de millions de chatons et de chats chaque année.

Plus le matou fait du marquage et qu'il se bat, moins la stérilisation aura un effet sur ces comportements.

QUAND DEVRAIS-JE FAIRE STÉRILISER MON CHAT?

Dans la plupart des cas, il est recommandé de faire stériliser le chat avant le début de la puberté. Celle-ci commence vers l'âge de 6 à 10 mois. L'âge de la stérilisation dépendra de la préférence de votre vétérinaire. Plusieurs vétérinaires recommandent la stérilisation vers l'âge de 6 mois. Pour avoir plus de détails sur les politiques de stérilisation, contactez votre hôpital vétérinaire.

EN QUOI CONSISTE L'OPÉRATION?

Nous vous recommandons de faire faire une analyse sanguine à votre chat une semaine avant l'opération. Ce bilan sanguin est important puisqu'il permet de savoir s'il y a des anomalies, plus précisément en lien avec les reins et le foie, qui sont les organes responsables d'éliminer les drogues anesthésiantes. Si une anomalie est révélée à la suite de l'analyse sanguine, nous adapterons notre protocole d'anesthésie pour que celle-ci soit sécuritaire pour votre chat. Parfois, l'opération doit être repoussée pour assurer le bien-être de l'animal. De plus, vous retournerez à la maison avec du Gabapentin — un médicament qui fait partie du protocole anesthésique et qui ne vous coûte rien. La raison pour laquelle nous donnons cette médication est parce qu'elle aide les patients à être plus à l'aise lorsqu'ils arrivent à la clinique pour leur opération. Elle permet aussi de diminuer la quantité d'anesthésiants nécessaires puisque, plus l'animal est calme, plus l'anesthésie est efficace. Elle aide aussi les patients à récupérer puisqu'elle permet de réduire le stress et l'anxiété lors du réveil.

Votre chat sera sous anesthésie générale. Il devra être à jeun 12 heures avant l'opération. Toutefois, il devrait avoir accès à de l'eau durant la période de jeûne. Votre vétérinaire pourra vous indiquer quand retirer l'eau avant l'opération.

Stériliser votre chat (mâle)



Hôpital vétérinaire
EMBRUN
Veterinary Hospital

Chez les chats mâles, les deux testicules sont retirés grâce à une petite incision sur le scrotum. Puisque les incisions sont très petites et que des sutures pourraient causer de l'irritation sur la peau sensible du scrotum, il est rare qu'elles soient suturées.

QUELLES POURRAIENT ÊTRE LES COMPLICATIONS APRÈS L'OPÉRATION?

En général, les complications à la suite d'une opération de stérilisations sont plutôt rares, cependant, comme avec toutes procédures chirurgicales, il y a toujours des petits risques :

Complications lors de l'anesthésie

Il est possible que votre animal ait une réaction à l'administration des médicaments. Ces situations sont imprévisibles et, heureusement, elles sont rares.

L'un des dangers provient du fait que le chat n'a pas bien jeûné avant l'anesthésie. Il est essentiel de bien respecter les instructions de votre vétérinaire.

De plus, tous signes de maladie devraient être rapportés à votre vétérinaire avant

Infections-postopératoires

L'infection peut se produire à l'intérieur ou autour de l'incision. Dans la plupart des cas, l'infection peut être contrôlée avec des antibiotiques.

SAVIEZ-VOUS?

- **Errance** : Ce comportement est réduit chez 90 % des chats après la stérilisation.
- **Bagarres** : Ce comportement est réduit chez 90 % des chats après la stérilisation.
- **Marquage urinaire** : Ce comportement est réduit chez 90 % des chats après la stérilisation.



Les informations contenues dans ce document sont basées sur le matériel rédigé par Ernest Ward, DMV

Droits d'auteurs 2005 Lifelearn Inc. Utilisé avec permission.

Droits d'auteurs 2011 – 2013 par le Veterinary Information Network, Inc.
Tous droits réservés.