

Protocole de vaccination du chiot



Hôpital vétérinaire
EMBRUN
Veterinary Hospital

Lorsque l'on parle de vaccins, il y a les vaccins « de base » et les vaccins « mode de vie ». Les vaccins de base sont ceux que tous les animaux devraient recevoir (comme le vaccin RRO chez les humains) et les vaccins « mode de vie » sont donnés en fonction du style de vie de votre chien (est-ce qu'il vit dans une zone à risque pour les tiques? est-ce qu'il est en contact avec des chiens inconnus? etc.). Chez les chiots, il faut administrer 1 ou 2 rappels pour que le niveau d'immunité soit acceptable. À droite, vous pouvez voir le calendrier de vaccination pour chiot.

VACCINS DE BASE

- DHPP (distemper canin, hépatite infectieuse, parainfluenza et parvovirus)
- Rage
- Leptospirose

VACCINS MODE DE VIE

- Bordetella (la toux de chenil) : recommandé pour les chiens qui sont en contact avec des chiens inconnus dans des endroits comme les parcs à chiens, les garderies et des cours d'éducation.
- Maladie de Lyme : protège contre la maladie transmise par les tiques.

8 semaines

- DHPP #1

12 semaines

- DHPP #2
- Leptospirose #1
- +/- maladie de Lyme #1
- +/- Bordetella

16 semaines

- DHPP (dernière dose)
- Leptospirose (dernière dose)
- Rage
- +/- maladie de Lyme (dernière dose)

Par la suite, les vaccins pour la maladie de Lyme, la toux de chenil et la leptospirose devront être rappelés chaque année. Les vaccins DHPP et de la rage seront rappelés dans un an et aux 3 ans ensuite.

