

3100 rue Jean-Yves
Kirkland, QC H9J
514-505-6555



2R6

Instructions

Post-Opératoires pour votre chien

Aujourd'hui, votre chien a été mis sous anesthésie générale et opéré. Nous vous prions de lire et de suivre les instructions suivantes afin d'accélérer la guérison de votre animal ainsi que sa récupération.

NOURRITURE :

Vous pouvez offrir à votre chien la moitié de sa portion habituelle de nourriture après 18h ce soir.

Donner de petites quantités d'eau en arrivant à la maison (1/2 tasse à la fois pour les petits chiens et 1 tasse pour les gros chiens) pour les 12 premières heures.

Votre chien pourrait refuser l'eau et la nourriture dans les premiers 24 heures. Cette situation est généralement normale et ne devrait pas vous alarmer à moins qu'elle ne dure pour plus 24 heures.

Certains chiens peuvent manger avec grande appétit ou boire excessivement dans les 12 heures suivants la chirurgie, ce qui pourrait causer des vomissements.

Certains chiens peuvent aussi avoir des selles molles dans les 24 heures suivants l'anesthésie. Le tout devrait revenir à la normale dans les 24 à 48 heures.

****Veuillez nous contacter si :*

L'appétit ne revient pas après plus de 24 heures

Les selles sont liquides ou qu'elles contiennent du sang

Les épisodes de vomissement se multiplient

VÉRIFIER LA PLAIE

Vérifier l'incision deux fois par jour. Une légère enflure et/ou rougeur est normale dans les premiers 24-48 heures.

Un léger saignement est aussi normal dans les premiers 24-48 heures

Veuillez ne pas donner de bain à votre chien pour les 2 prochaines semaines

Vous pouvez nettoyer doucement la plaie avec un linge humide s'il y a un peu de sang mais veuillez ne pas appliquer de bandage ou de crème à moins qu'on ne vous le demande.

****Veuillez nous contacter si :*

Vous voyez des saignements abondants ou des signes d'infection (tels qu'une augmentation de l'enflure, de la douleur, des rougeurs ou des écoulements jaune/verts) ou encore si les points sont tombé dans les 10 jours suivants la chirurgie.

NOTE : Si la plaie chirurgicale ouvre moins de 5 jours après la chirurgie, SVP la couvrir et nous appeler. C'est RAREMENT une urgence mais nous risquons de devoir refermer la plaie et des antibiotiques pourraient être nécessaires. Si la plaie ouvre après les premiers 5 jours suivant la chirurgie, nous n'aurons probablement pas besoin de la refermer mais des antibiotiques pourraient être nécessaires. Nous vous prions donc de nous appeler dès que possible.

EXERCICE

Limiter l'exercice pour la première semaine suivant l'opération. Les chiens ne devraient être sorti qu'EN LAISSE, uniquement pour faire leurs besoins, dans les premiers 48 heures, puis pourront être promené en laisse toujours, pour de petites marches seulement, pour les 5 jours suivants.

Veuillez ne pas laisser votre chien sauter, courir ou jouer énergiquement. Ceci pourrait ralentir le processus de guérison et même causer des complications telles que le développement de liquide dans la région de la plaie.

AUTRES INSTRUCTIONS

Les chiens mâles doivent porter leur collier élisabéthain pour 7 jours, même chose pour les femelles qui lèchent leur plaie.

La plaie chirurgicale de votre chien a été fermée soit par des points de sutures résorbables visibles, des points sous la peau qui sont aussi résorbables ou encore avec une colle chirurgicale.

Les points de suture prennent de 2-3 mois à se dissoudre par eux même mais vous pouvez prendre rendez-vous dans 10-14 jours pour les faire retirer sans frais par une de nos techniciennes si vous le désirez.

Veuillez administrer toute médication telles que prescrites

Si des prises de sang ou des radiographies de hanches ont été effectuées, une copie des résultats est attachée au présent document.

****SKYE EST DU POUR UN RAPPEL DE VACCIN POUR LEPTOSPIROSE DANS 10-14 JOURS AVEC UNE TECHNICIENNE*****

N'HÉSITEZ SURTOUT PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES INQUIÉTUDES.

J'ai lu et compris ces instruction post-opératoires :